

一般社団法人福岡市医師会
定例記者会見


令和3年12月1日(水)13時30分

福岡市医師会 常任理事 中山 英樹

一般社団法人 **福岡市医師会**



1. 検体採取数と陽性数（福岡市医師会診療所） （令和3年10月～11月）



■ 検査採取数 ■ 陽性数

13,144件 **1,145件**
 (令和2年5月～令和3年11月30日まで)

※陽性率
 令和2年5月～令和3年11月30日まで 8.7%
 令和3年10月 0.8%
 令和3年11月 0%



2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業

接種場所	接種実績
<p>①個別接種（地域のクリニック850箇所）</p> <ul style="list-style-type: none">・10/3以降は12～15歳への接種のみ （～10/31 約200医療機関、11/1～11医療機関） ※12～15歳への接種実績34,361回 （接種率29.3%）（R3/11/29現在）	<p>約131万回</p>
<p>②集団接種</p> <ul style="list-style-type: none">・11/1以降は中央体育館とKITTE博多に集約・延べ4,470名の医師派遣 （R3/6/1～11/30）※臨時接種等への医師派遣にも対応	<p>約80万回</p>

R3/11/29 現在



3. 薬局での医療用抗原検査キットの取扱い

<医療用抗原検査キットの使用にあたって>

○無症状者への使用は推奨されていない

○陰性の場合でも偽陰性の可能性を考慮

※厚生労働省事務連絡（令和3年9月27日）

（抗原検査キット不良により130万個自主回収（令和3年11月15日））

※検査キットの結果、陽性の場合は

「受診・相談センター」（☎092-711-4126）

までお電話してください



4. 第6波への取組み

＜自宅療養支援体制＞

- ・ 電話等情報通信機器を用いた診療
327件対応（8/11～11/30保健所報告件数）
- ・ 自宅療養者への往診 や
外来受診による診療 について
会員医療機関にアンケート実施
（体制整備について福岡市と検討中）



5. 後遺症への対応

<後遺症について>

後遺症の代表的な症状	
呼吸器症状	全身症状
咳 喀痰 息切れ 胸痛	倦怠感 関節痛 筋肉痛
精神・神経症状	その他の症状
記憶障害 集中力低下 不眠 頭痛 抑うつ	嗅覚障害 味覚障害 動悸 下痢 腹痛

※厚生労働省：新型コロナウイルス感染症
診療の手引き 第6.0版より

回復者457人を対象にした追跡調査
(日本国内の研究)

- 急性期症状：軽症84.4%、中等症12.7%、重症2.9%
- 発症または診断から6カ月後には無症状73.7%、12カ月後には無症状91.2%
- 12カ月後に何らかの症状を認めた8.8%のうち、記憶障害(5.5%)、集中力低下(4.8%)、抑うつ状態(3.3%)、疲労感(3.1%)、息切れ(1.5%)、嗅覚障害(1.1%)、咳(1.1%)、味覚障害(0.4%)、脱毛(0.4%)

※厚生労働省にて後遺症に特化した

「診療の手引き」作成中



6. 追加（3回目）接種の効果

Q1 追加（3回目）接種には、どのような効果がありますか

**A1 追加接種を行わなかった場合と比較して、
感染予防効果や重症化予防効果等を高める
効果があります。**

※ファイザー社製ワクチンの接種後研究（イスラエル）
追加接種した場合の入院予防効果93%、
重症化予防効果92%、死亡に対する予防効果81%



7. 追加（3回目）接種の副反応

Q2 追加（3回目）接種ではどのような副反応がありますか。2回目より重いのでしょうか。

A2 ファイザー社製ワクチンの場合、2回目の接種後と比較して**有害事象の発現傾向は概ね同様**であると確認されています。



8. 追加（3回目）接種の時期

**Q3 初回（1回目・2回目）接種がまだ受けられて
いません。**

**追加（3回目）接種が開始されても、初回
接種を受けることはできますか。**

**A3 接種が受けられる期間は、令和4年9月
30日までです。**

**この期間内であれば、初回接種も
受けられます。**



9. 追加（3回目）接種の体制（福岡市）

○対象者

2回目接種から概ね**8ヵ月以上経過**した
18歳以上の方（市より接種券が順次送付）

※接種対象の方に **接種券** が送付されます

○接種場所（接種券送付後）

- ①地域のクリニック（個別接種）
- ②公共施設等（集団接種）
- ③高齢者施設への出張接種

