

福岡市医師会 定例記者会見資料

| ご質問と回答 |   |   |
|--------|---|---|
| NO     | ご質問   | 回答  |
| 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ワクチン接種状況について、4回目接種が6月1日からスタートするが3回目接種もあまり進んでいない。この状況について。</li> </ul>   | <p>2.総論<br/>福岡市感染症概況等<br/>…スライド資料の中で<br/>お伝え致します。</p> |
| 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナは終息の兆しは見えない状態で、多くの病院で続く面会制限はどのような状況になれば、制限が緩和する動きになるのか見通し。</li> <li>面会制限が長く続く状況について、現場から上がっている声など。</li> </ul> | <p>4.質疑応答<br/>…質疑応答にて<br/>お伝え致します。</p>                |

※ご質問に対する回答は定例記者会見時点での内容です。今後の感染状況等により内容が変更になる場合があります。

令和4年6月1日

一般社団法人福岡市医師会  
**定例記者会見**

**令和4年6月1日(水)13時30分**

**福岡市医師会 常任理事 平川 勝之**

一般社団法人 **福岡市医師会**



# 1. 報道機関からのご質問

1. 新型コロナは終息の兆しは見えない状態だが、多くの病院で続く面会制限はどのような状況になれば、緩和する動きになるのか見通しについて伺いたい。



## 2. 医療従事者の濃厚接触と就業停止の判断

|        | 曝露<br>※確定例との接触が下記①～③を<br>全て満たす場合   | 推奨される个人防护服の<br>使用の有無   |
|--------|--|--|
| 【高リスク】 | <p>①<b>感染性期間内の接触</b><br/>感染者の発症2日前から隔離開始までの間に接触があった</p> <p>②<b>長時間(15分以上)の接触</b><br/>ただし、エアロゾルが発生する手技を行った場合は時間の長さは考慮しない</p> <p>③<b>濃厚接触</b><br/>推奨される个人防护具を着用せずに確定例から約2メートル以内にいた、または確定例の分泌物や排泄物に直接接触した</p> | <p>①医療従事者はサージカルマスク、N95マスクのいずれも着用していなかった</p> <p>②確定例がマスクを着用しておらず、かつ、医療従事者が目の防護具(ゴーグルやフェイスシールド)を着用していなかった</p> <p>③医療従事者がエアロゾル発生手技を実施した際に、推奨される个人防护具(ガウン、手袋、目の防護具、N95マスク)を着用していなかった</p> |
| 【低リスク】 | 上記以外の接触があった  | —  |

出典：一般社団法人 日本環境感染学会  
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第4版」より作成



### 3. 報道機関からのご質問

2. 面会制限が長く続く状況について  
現場から上がっている声など  
あれば伺いたい。

