在宅カルテ(記入例:要支援)

様式2は、かかりつけ医 やサービス提供者等が 様式2

記入する 事業所名 かかり つけ医確認欄 連絡事項 記載者名 2 20 12:00 |創は縮||ゲしてきましたが、前脛部の治癒進行が遅いです。全体に軟膏を 確認後にサインを お願いします 塗布しています。右足の第3指は1週間程前に新たな水泡が出来ましたが 治癒傾向にあります。Div実施中に比べると、全体に治癒の進行は停滞気味です。 ステーションA Bクリニック 処置変更等ありましたら、ステーションに連絡を頂ければと思います。 利用者の心身の状態等に関し、特 筆すべき事をご記入下さい。 緊急性の高い場合は、直接電話等 で連絡を取り合って下さい。 2 21 | 16:00 | 確かに右下腿の潰瘍は治癒の速度が滞っている印象です。 浸出液はない 本日からB軟膏に変更しました。様子をみて、DIVの再開を検討します。 近所の買物等、無理にならない程度であれば外出可と話しています。 B クリニック (十分足を温かくして) 特に重要な伝達事項は赤字で記入する、赤で アンダーラインを引くなど工夫して下さい。 26 | 16:15 | 靴は今取り寄せてもらっています(デモ用)。3/1の〇時にご持参頂くことになって C 包括支援センター います。当方も伺わせていただきます。 3 10:00 靴のお試しを納品させて頂きました。靴のサイズが合わなかったため、後日商品を D 福祉用具 お持ちします。 1 11:00 B先生からお話頂いた後、一度だけコンビニに行かれたとの事。 「随分、時間はかかったけど、足はそう痛くなかった」との事ですが、靴が来るまでは 待っておられるようにお話しました。 (ヘルパー事業所〇〇さんへ) おやつ類など依頼するのがお恥ずかしいかもしれませんので、お声かけを(して下さ C 包括支援センター っている事と思いますが)どうぞ宜しくお願いします。 00 3 1 14:00 | 何でもお買物おっしゃって下さいと声かけをしています。今日は治療用のテープと E 訪問介護 バブを頼まれました。 00 3 10:00 | 靴を納品させて頂きました。ご本人も大変満足されているご様子です。 D 福祉用具 00 3 12:00 やはり、創の前脛部付近の治癒進行だけが遅いです。その部分だけB軟膏を使って みてもよいでしょうか。前回の創の時のようにB軟膏とA軟膏を使い分けていくような ステーションA 感じで。指示の変更があれば、在宅カルテにご記入お願いします。 00

様式2は、かかりつけ医 やサービス提供者等が

在宅カルテ(記入例:要介護)

様式2

ĦĦ	記入	しする	連絡事項	事業所名	かかり つけ医
			建船争员	記載者名	確認欄
2	28	11:00	両下肢 背部の掻痒感ひどく軟膏塗布しています。臀部にも掻き傷あり、2~3ヵ所	訪問入浴	Aクリニック
			出血あります。肛門周囲にもびらんありますが 利用者の心身の状態等に関し、特筆すべき事をご記入下さい。 緊急性の高い場合は、直接電話等で連	00	00
3	5	11:00	終を取り合って下さい。 眠剤を内服すると、掻痒感が増強するので、	ステーションA	
			そのためか、掻痒感はありませんが、夜間覚醒ぎみなようです。	00	
			肛門周囲にはワセリン+亜鉛軟膏を塗布しています。	確認後にサインをお願いします	- 11
3	13	14:00	眠剤中止後、掻痒感は軽減しているので、このまま様子を見ます。	Aクリニック	Aクリニック
				00	00
3	14	16:00	掻痒感は軽減していますが、ステロイド剤(PSL)6mgでしばらく続けます。	C 皮膚科	
				00	
3	16	16:50	立ち上がり訓練時に「オシッコがしたい」との訴えあり、介助にてトイレに行き、排尿	訪問リハ	
			可能でした。同様に洗面所で手洗いも行いました。	00	
3	18	10:00	眼脂が多く、点眼薬のみでの効果がうすいためMRSAの可能性もあり、P-Aヨードで	D眼科	
			両側洗眼しています。	00	
3	20	19:00	 栄養剤様のもの、中等量嘔吐されており、「少し気分が悪く吐きました」と言われ、	ショートステイ	
			その後は嘔吐なくバイタル安定、顔色も良好でした。	00	
3	25	14:00	四肢の動きは以前より改善しています。この半年は上肢もよく動くようになっています。	B整形外科	
4	2	16:00	背部の痒みを強く訴えてあります。清拭も拒否されましたが、実施。	訪問介護	
			THE PROPERTY COMMITTEE CONTRACTOR	00	
4	10	16:00	 掻痒はある場所には皮疹はなく、乾燥性の皮膚掻痒症と思われます。	C皮膚科	
7	10	10.00	保湿と内服で経過を見ます。PSLは 6mg から 5mg に減量しました。	00	
4	14	17:00	株型と内がでは過ぎ見より。FSLは Olig から Slig に減量しようた。 特に重要な伝達事項は赤ショートステイでの体重測定 35.7kg。4ヵ月前は 33kg でしず 字で記入する、赤でアンダーラインを引くなど工夫して下さい	家族	
4	18	14:00	少し太った感じです。経管栄養のカロリーを100kcal 減らします。	Aクリニック	Aクリニック
			別紙に新しい経管栄養処方を記載してます。	00	00